

ED治療薬を購入し使用したことがある方 へのアンケート調査概要及び結果一覧

令和7年9月
医療法人 予防医療会
メディカルアルファクリニック

1 調査の概要

1.1 調査の目的

ED治療薬（バイアグラ／シアリス／レビトラ等）を購入・使用した経験がある方に対し
て、入手方法・使用した薬の種類・効果・副作用・費用・体験談などについて実際の声を収
集し、概要をまとめることで、今後利用を検討している方の参考資料とすることを目的とし
ています。

そのため、公的機関・製薬会社から得られる情報に加え、第三者モニターを対象としたアン
ケート調査を実施しました。

1.2 調査の対象

ランサーズを通じて、ED治療薬を購入・使用した経験がある10代～60代以上の男女を対象
にアンケートを実施しました。

1.3 調査期間

2025年9月9日～2025年9月23日

1.4 調査項目

対象者の年齢を確認した上で、以下の質問事項を調査しました。

- 年齢
- ED治療薬の入手方法（オンライン診療／対面診療／個人輸入／その他）
- 使用したED治療薬の種類（バイアグラ／シアリス／レビトラ／その他）
- 薬代にかかった費用（価格帯）
- 副作用の有無と具体的な症状
- 使用により「感度が落ちた」と感じたか
- 感度に関する体験談（5文字以上）
- 服用後、一晩で性行為が何回できたか
- 射精後の「賢者タイム（休憩時間）」に変化があったか
- 賢者タイムに関する体験談（5文字以上）
- 薬の効果を感じられたか
- 使用したED治療薬の満足度（10～100%）

1.5 調査結果の活用

回答者から得られた実体験に基づく統計データおよび体験談は、今後ED治療薬を利用しよ
うと考えている方に向けた参考資料として活用します。

1.6 調査の実施状況


2025年9月23日時点で、74名の方から回答を得ました。

2 調査結果

2.1 年齢

今回アンケートに回答していただいた74名の方の年齢分布は以下の通りでした。

年齢分布




| 年齢 | 回答数 | 割合 |
|-------|-----|--------|
| 20代 | 8人 | 10.81% |
| 30代 | 22人 | 29.73% |
| 40代 | 22人 | 29.73% |
| 50代 | 17人 | 22.97% |
| 60代以上 | 5人 | 6.76% |

2.2 ED治療薬の入手方法

ED治療薬の入手方法（オンライン診療／対面診療／個人輸入／その他）についてアンケートを実施しました。

ED治療薬の入手方法




| 入手方法 | 回答数 | 割合 |
|--------------------|-----|--------|
| オンラインクリニックを受診 | 42人 | 56.76% |
| 対面診療ができるクリニックに出向いた | 16人 | 21.62% |
| インターネットを利用した個人輸入 | 14人 | 18.92% |
| その他 | 2人 | 2.70% |

2.3 使用したED治療薬の種類

使用したED治療薬の種類（バイアグラ／シアリス／レビトラ／その他）についてアンケートを実施しました。複数回答を可能にしています。

使用したED治療薬の種類




| 入手方法 | 回答数 |
|-------|-----|
| バイアグラ | 51人 |
| シアリス | 18人 |
| レビトラ | 14人 |
| その他 | 9人 |

2.4 薬代にかかった費用

薬代にかかった費用（価格帯）についてアンケートを実施しました。

薬代にかかった費用




| 費用 | 回答数 | 割合 |
|------------------|-----|--------|
| 5,000円未満 | 30人 | 40.54% |
| 5,000~10,000円未満 | 31人 | 41.89% |
| 10,000~20,000円未満 | 10人 | 13.51% |
| 20,000~30,000円未満 | 2人 | 2.70% |
| 30,000円以上 | 1人 | 1.35% |

2.5 副作用の有無

使用した薬の副作用についてアンケートを実施しました。

副作用の有無




| 項目 | 回答数 | 割合 |
|-----|-----|--------|
| はい | 30人 | 40.54% |
| いいえ | 44人 | 59.46% |

2.6 感度の変化

使用により「感度が落ちた」と感じたかについてアンケートを実施しました。

「感度が落ちた」と感じたか



| 項目 | 回答数 | 割合 |
|-----|-----|--------|
| はい | 15人 | 20.27% |
| いいえ | 59人 | 79.73% |

2.7 感度に関する体験談

ED治療薬使用したことによる感度の変化についてアンケートを実施しました。

| |
|---|
| 薬の効果で頑張ることはできたんですけど、何だが気持ちがいい感じは薄れていたように感じる。 |
| 持続性がUPするのはもちろんのですが、それに伴って基本的には感度も良くなつたように感じることが多い気がします。 |
| 感度はとくに落ちていないと思っています。 |
| 服用すると十分な硬さが得られるため、逆に自信を持って性行為に臨めるようになりました。感度自体は変わらず、自然な感覚のまま楽しめました。 |
| ED治療薬を使ってみたら、勃起はするが若干、感覚が麻痺したような感覚になる事があり、挿入中の快感が薄くイケない事があった。 |
| 該当しない |
| 自分自身の勃起力の向上につながりました。 |
| 何錠が使用して性交渉をしましたが、気持ち硬くなつて感度も良くなつた感覚がありました。 |
| 過度な勃起により感覚が鈍くなつた |


| |
|--|
| 感度の変化は感じなかった。 |
| 実際のところ、効果もなければ副作用もなかった |
| 感度が落ちたことはありません。 |
| 感度が落ちたというよりは遅漏気味になった。 |
| 感度は良くなった。頭が少し熱ったような感じで興奮度が増した気がした |
| 特に感度の変化は感じず、普通に挿入し、射精できました。 |
| 硬度が増したことにより普段感じられなかった征服感のようなものを感じた。しかし、血管拡張作用により翌日には頭痛に悩まされることが頻回だったので、現在使用する際には先行して頭痛薬を服用するようにしている。 |
| 無理に立たせていて、やや神経過敏気味というか筋肉痛というような印象を受けるため、感度は落ちました。 |
| 朝、勃起します。勃起の固さが増しました。今では、中折れの不安はありません。 男の自信がよみがえりました。 |
| 中折れしにくくなつた。 |
| 短期間だったこともあり、感度の変化は感じられませんでした。 |
| 使わなかつたころより感度が鈍く弱くなつた気がする |
| 下半身への血流が良くなっているのを感じます。感度に関しては通常と変わらない |
| 感度の変化はありませんでしたが、ED治療薬を使用しても必ずしもEDが改善する訳ではなかったので、使用後にAVを見るなど工夫をしていました。 |
| 感度が治療前より落ちて早漏ではなくなつた。 |
| 感度が落ちたということはない。 |
| 特になかつたです。 |
| ED治療薬でも即効型の薬でしたので効果が出るのが早かったです。 持続力は3時間くらいでした。 |
| 直接の変化はないと思いますが、勃起が強まる結果としてよくなつたように感じます。 |
| 感度の変化は無く、発射までの時間は使用してもしなくて同じ。 |
| 感度の変化はありませんでした。 |
| 特に変化はなく、自然な感覚で使用できました。 |
| 特に感度の変化はない。 |
| 変化はない。 |
| 副作用として一時的に感度が鈍く感じることがあったが、服用を続けるうちに通常に戻つた。 |
| 治療薬の種類にもよるのですが、感度はいつもの2倍?くらいはありました、変化は大きくなり、発射しづらい、すぐにもう一度できる 勃起が止まらない |
| むしろ感度が高まつた気がする |
| 食事後に使用すると効果はないのが良く分かった。食間に使用すると30分くらいで効果が出てくる。 |
| 彼女との性行為で若干ではありますが、以前より感度が落ちたような気がします。 |
| 特に感じない |
| 感度についての変化は感じませんでした。 |
| ED治療薬を使用したことで、感度は以前より良くなつたと感じています。 |
| 2回目にフィニッシュできず、感覚にまひのような感覚があるように思えます。 |

| |
|---|
| 特に変化なし |
| バイアグラを使用した際、勃起力は確かに安定しましたが、感度自体は大きく変わらなかつたと感じています。むしろ緊張が減ってリラックスできることで、自然に集中できるようになり、以前より快感を素直に受け止めやすくなつたのが良い変化でした。 |
| なしですね |
| 飲用後の効果はすごくいつもより長い時間楽しめました。勃起力が強く本当に満足でき、次回も使いたいと思いました。 |
| 感度の変化はないです |
| 気持ちに余裕が生まれたようで、感度はやや良くなつたです。前座でギンギンになり、ゆっくり挿入し、クライマックスで絶頂に到達できた日には、生きていて良かったと思いました。 |
| 勃起の持続力は向上したが、感度に変化はなかつたです。 |
| 早漏気味だったので感度が丁度良くなつて長持ちするようになった。 |
| 感度はあまり気にしたことはないです。 |
| 特になかった。 |
| あまり感度が落ちたことはない。 |
| 感度が上がつたように思います。 |
| 勃起力もアップするのでサイズ的に大きくなつた感じがするし、パートナーも同じように感じてくれた。 |
| バイアグラを服用することで勃起の維持力がアップしたので、そのことで自信に繋がつてパートナーを満足させることができました。それによって性的な興奮や満足感を得ることができたので感度が向上したと実感が湧きました。 |
| 明らかに硬さが違つて、まるで昔に戻つたみたいだつた |
| 感度の変化は感じられなかつた |
| 妻と時間を重ねる程波が重なるように感度が増した。 |
| 凄く薬が効いてます |
| 頭痛がする |
| 服用前は勃起はしましたがキープ力がなくて中折れ、収縮する状態でした。服用後はそれら全てが改善され陰茎の硬さも増したような感じでした。 |
| 動悸が激しくなつてそちらに気が行つてしまい感度が下がつた |
| 感度が落ちた所感はなかつたです。 |
| ただ勃起してるだけという感じで、感覚があまりなかつた |
| 私の場合、むしろ感度はよくなりました。ただ感度が良くなつたからといって射精感が速く訪れるわけでもなかつたので、私的には最高でした。 |
| いつもよりも硬さを感じました。 |
| 何時もより持続感があります |
| 維持力は高まりましたが、血流が良くなるせいか、若干感度は落ちてしまう感覚にはなつてしましました。 |
| より感度が上がつた気がしています。 |
| 感度については全く変化が無かつた。 |
| セックスの1時間前に飲んだらビンビン状態になります。 |
| 薬を使っても特に感度が落ちた感じはありませんでした。 |
| 変化はない。 |

2.8 服用後、一晩で性行為が何回できたか

ED治療薬を服用後、一晩で性行為が何回できたかについてアンケートを実施しました。

服用後、一晩で性行為が何回できたか




| 項目 | 回答数 | 割合 |
|-----------|-----|--------|
| 0回 | 0人 | 0.00% |
| 1回 | 26人 | 35.14% |
| 2回 | 38人 | 51.35% |
| 3回 | 4人 | 5.41% |
| 4回以上 | 3人 | 4.05% |
| 回数は覚えていない | 2人 | 2.70% |

2.9 射精後の「賢者タイム（休憩時間）」に変化があったか

ED治療薬を使用後、射精後の「賢者タイム（休憩時間）」に変化があったかについてアンケートを実施しました。

射精後の「賢者タイム」に変化があったか



| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---------|-----|--------|
| 変化があった | 33人 | 44.59% |
| 変化はなかった | 40人 | 54.05% |

2.10 賢者タイムに関する体験談

ED治療薬使用したことによる賢者タイムの変化を、5文字以上でお伺いしました。

| |
|--|
| 動機が高くなり、なんだか気持ちが悪くなってしまった。 |
| 特に変わらない気がします。 |
| 賢者タイムはとくに変化がないのかなと思います。 |
| 特に変化はなく、通常通りの休憩時間でした。 |
| ED治療薬を使用する事によって行為を始める際の勃起のしやすさや硬さに確かな変化は出たが、賢者タイムに変化はありませんでした。 |

| |
|---|
| まだできそうだと感じた |
| 賢者タイムが長く続いた気がします。 |
| 基本、1回で十分なタイプなので満足度はあった感じです。 |
| 勃起が硬くなりすぎること |
| 特に変化は感じなかった。 |
| もともと一晩に1度しかしないので、その効果を試すことがない |
| あまり賢者タイムに変化はなかったように思います。 |
| 特に以前とは変わらない。 |
| 特になかった |
| ありませんでした。 |
| 行為の激しさが増した影響か、より疲労を感じるようになり賢者タイムが長くなった気がする。 |
| 休憩時間がほぼない状態で2回戦ができました。 |
| 変化はなかった |
| すぐに復活して行為を行えた |
| 特にありませんでした。 |
| 特に変化を感じなかった |
| 賢者タイム中でも下半身への血流を感じ 勃起が継続する |
| 変化はありませんでした。 |
| 治療薬を使ってから賢者タイムがなくなり連続で性行為ができた。 |
| 変化はなかった |
| 回復時間がかなり短縮した。 |
| そこには特に変化は無かったです。 |
| 回復は明らかに早まります。気持ちの問題としてはそれほど変わらないかもしれません、再び勃起できるまでの時間は大きく短縮されます。 |
| 気持ちの変化は無いが、発射後も勃起は持続する。 |
| 変化は特にありませんでした。 |
| 特に変化は感じませんでした。 |
| 変化はなかった、単純にボッキの持ちが良くなったのみ。 |
| 変化はない。 |
| 服用後は射精後の休憩時間が短くなり、次の性行為までの間隔が以前より短く感じた。 |
| 賢者タイムはなく、すぐにもう一度できました。 |
| 特に変化はない |
| 後でもまだまだ元気な状態に戻る |
| 賢者タイムが薬を使用する以前に比べると、賢者タイムが長くなった気がします。 |
| 特になかった |
| 勃起持続時間が長くなり射精後の勃起回復までの時間が短くなった。 |
| 賢者タイムの変化に関しては、ED治療薬を使用したことによる変化は特にありませんでした。 |
| 次に立つまでの時間が30分になり、2回目に挑戦できるようになりました。ただし、2回目はフィニッシュで |


| |
|--|
| きませんでした。 |
| すぐ回復するのが良い。 |
| 服用すると射精後も勃起が持続しやすいため、通常より賢者タイムが短く感じられました。普段はしばらく動けないのですが、バイアグラを使用したときは体力さえあれば再度行為に入ることが可能で、パートナーとの時間が長く取れたのが印象的でした。 |
| なしですね |
| 賢者タイムの変化はありません。 |
| 変化はなかったです |
| 特ににはなかった。ティッシュで拭いて、寝てしまいました。 |
| ED治療薬使用前は1回射精したらやる気ゼロでしたが、使用後は賢者タイムから10~20分くらいで勃起できました。 |
| 賢者タイムが4時間くらいだったが、2時間くらいに短縮しました。 |
| 変化はありません |
| いつもより短くなった。 |
| 変化はありません |
| 賢者タイムの時間が短くなった。 |
| 特に変化を感じていない。 |
| ありません。 |
| 使う前よりダルさがありませんでした |
| いつもより短くすぐ2回目にうつれた |
| 変化はなかった |
| 特に変化はない |
| かなり快適になった |
| 性行為同様に射精するまでに勃起状態を維持できず、かなりの時間を要していましたが少し間隔を開けて2~3回射精を迎えるなど確実にバイアグラの効果を実感できました。 |
| 特に変化はなかった |
| 目立った変化は感じませんでした。 |
| 射精したあとも勃起状態が続いていた |
| 賢者タイムはやり方次第ですね。 例えば普通のセックスのように、射精後に休憩をしてしまうと賢者タイムに入ってしまいます。二回戦までに映画を見てしばらくのんびり過ごす、食事をとるといった休憩がないとその気にはなりません。 でも射精後もそのまま動き続けていると、賢者タイム無しでそのまま出来てしまうんです。 普通は射精すると萎んでしまいますし、触る等刺激を与えられてもくすぐったさを覚えたりして性的な興奮は得られません。 でもED治療薬の効果が出ていると、射精しても動いていれば(刺激を与え続ければ)萎えません。 愚息が勃起したままだからか、その刺激が心地よいんです。 また動き続けることによって女性は感じてしましますし、その姿も良い興奮材料となります。 そしてそのまま二回戦へ突入ということも出来るので、射精後にどうするかで賢者タイムの有無は決まってくるように思います。 |
| 普段よりも回復力が圧倒的にありました。 |
| 何時もわーい回やればくたくたなのですが二回できます |

| |
|--|
| 賢者タイムになる時間が短く、直ぐに性欲が再び湧いてくるような気持ちになりました。 |
| 賢者タイムがいくぶん短くなった気がします。 |
| 服用後は以前よりも持続力を感じることが出来て、一度射精した後も勃起状態は継続して続いていた。 |
| 変化はなかったです。 |
| 賢者タイムは以前と変わらず、特に短くなったり長くなったりはしませんでした。 |
| 変化はなかった |

2.11 薬の効果を感じられたか

薬の効果を感じられたかについてアンケートを実施しました。

薬の効果を感じられたか




| 項目 | 回答数 | 割合 |
|-----------|-----|--------|
| とても感じた | 35人 | 47.30% |
| ある程度感じた | 36人 | 48.65% |
| あまり感じなかった | 3人 | 4.05% |
| 全く感じなかった | 0人 | 0.00% |

2.12 使用したED治療薬の満足度

使用したED治療薬の満足度についてアンケートを実施しました。

使用したED治療薬の満足度



| 項目 | 回答数 | 割合 |
|----------------|-----|--------|
| 100% (大満足) | 12人 | 16.22% |
| 80~90% (とても満足) | 37人 | 50.00% |
| 60~70% (満足) | 21人 | 28.38% |
| 50~60% (普通) | 3人 | 4.05% |
| 40~50% (少し不満) | 1人 | 1.35% |
| 10~40% (不満) | 0人 | 0.00% |